

RS Mulia Pajajaran



VISI

Menjadi rumah sakit unggulan di kota Bogor dan sekitarnya dengan pelayanan yang tulus dan professional.

MISI

- ◆ Memberikan pelayanan kesehatan yang bermutu dan sesuai standard
- ◆ Menyiapkan sumber daya manusia yang professional
- ◆ Menyediakan alat alat kedokteran yang mengikuti teknologi

Rs. Mulia Pajajaran


Jln. Pajajaran no.98 Kota Bogor
Tlp (0251) 756 6220 / 837 9898
Hp/WA 0813 1640 4288 | IGD 756 6222

info@rsmulia.co.id | www.rsmulia.co.id
Facebook : rsmuliapajajaran
Instagram : rsmuliapajajaran



MD 1.7/VI.PKRS/2019

PENANGANAN KEJANG DEMAM SEDERHANA



RS MULIA PAJAJARAN

KEJANG DEMAM PADA ANAK



1. Kejang demam adalah bangkitan kejang pada anak, yang terjadi pada kenaikan suhu tubuh (suhu anak lebih dari 38 derajat celsius)
2. Kejang demam terbagi menjadi 2 yaitu kejang demam sederhana dan kejang demam kompleks. Kejang harus dibedakan dengan epilepsy.
3. Kejang tidak selalu timbul pada suhu tinggi, kadang-kadang demam yang tidak begitu tinggi dapat menyebabkan kejang
4. Kenali **tanda dan gejalanya**, seperti :
 - a. Perhatikan gerakan tangan, kaki, dan muka yang menyentak-nyentak atau kaku
 - b. Bola mata berputar ke arah belakang mata
 - c. Pernafasan bermasalah & Muntah
 - d. Suhu badan meningkat biasanya lebih dari 38,5 derajat celsius & Hilang kesadaran

PENYEBAB KEJANG DEMAM

PADA ANAK

Pada **kejang demam kompleks** ditandai dengan :

- a. Adanya kejang disertai demam
- b. Bersifat umum
- c. Lama kejang lebih dari 15 menit
- d. Kejang multiple, dalam 1 hari ada 2 atau lebih bangkitan kejang

Pada kejang demam sederhana ditandai dengan :

- a. Umur anak waktu kejang pertama 4 bulan sampai 4 tahun
- b. Kejang bersifat umum
- c. Kejang berlangsung tak lebih dari 5 menit
- d. Frekuensi bangkitan kejang tak lebih dari 4 kali dalam setahun dan tidak multiple



BAGAIMANA PERAWATAN KDS ?

1. Baringkan anak pada tempat yang aman
2. Longgarkan pakaian anak sekitar kepala dan leher
3. Cegah lidah jangan sampai tergigit dan menutupi jalan nafas
4. Berikan kompres hangat pada dahi dan aksilla
5. Kenakan pakaian tipis yang mudah menyerap keringat
6. Jangan berikan minum saat anak kejang
7. Segera miringkan anak setelah kejang berhenti
8. Orang tua jangan panic ketika menghadapi kejang demam panas tinggi
9. Jika terjadi hal-hal yang dapat menyebabkan kejadian yang berlanjut, segera bawa ke pelayanan kesehatan

